

平成30年度 データヘルス計画における分析結果 訂正とお詫び

名古屋市職員共済組合 共済組合ニュース第134号 (令和元年12月13日発行)p.5~p.8に掲載した「データヘルス計画における分析結果 平成30年度」において、集計に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。

訂正前後の集計は以下のとおりです。

| ページ | 項目 |
|------|---------------------------------|
| p. 1 | リスクの保有状況(表1) |
| p. 2 | 組合員 血圧/血糖/脂質リスク者の状況 (表2, 3, 4) |
| p. 3 | 被扶養者 血圧/血糖/脂質リスク者の状況 (表5, 6, 7) |
| p. 4 | 肥満度と医療費の関係(表8) |
| p. 5 | 腎機能リスク者の状況(表9, 10) |

訂正前(全年齢)

表1: リスクの保有状況

| 区分 | 対象者数 | 健診受診者 | 分析数 | 項目別のリスク保有者 | | | | |
|------|---------|---------|---------|------------|------|------|--------|--------|
| | | | | 血圧 | 血糖 | 脂質 | 肥満 | 喫煙 |
| 全体 | 20,927人 | 17,678人 | 16,418人 | 2,335人 | 683人 | 669人 | 4,040人 | 2,425人 |
| | | | | 14.2% | 4.2% | 4.1% | 24.6% | 14.8% |
| 組合員 | 15,142人 | 14,455人 | 13,175人 | 1,934人 | 616人 | 635人 | 3,527人 | 2,293人 |
| | | | | 14.7% | 4.7% | 4.8% | 26.8% | 17.4% |
| 被扶養者 | 5,785人 | 3,243人 | 3,243人 | 401人 | 67人 | 34人 | 513人 | 132人 |
| | | | | 12.4% | 2.1% | 1.0% | 15.8% | 4.1% |

訂正後(40歳~74歳)

表1: リスクの保有状況

| 区分 | 対象者数 | 健診受診者 | 分析数 | 項目別のリスク保有者 | | | | |
|------|---------|---------|---------|------------|------|------|--------|--------|
| | | | | 血圧 | 血糖 | 脂質 | 肥満 | 喫煙 |
| 全体 | 20,927人 | 17,698人 | 15,688人 | 2,307人 | 675人 | 664人 | 3,941人 | 2,381人 |
| | | | | 14.7% | 4.3% | 4.2% | 25.1% | 15.2% |
| 組合員 | 15,142人 | 14,455人 | 12,793人 | 1,914人 | 609人 | 631人 | 3,458人 | 2,256人 |
| | | | | 15.0% | 4.8% | 4.9% | 27.0% | 17.6% |
| 被扶養者 | 5,785人 | 3,243人 | 2,895人 | 393人 | 66人 | 33人 | 483人 | 125人 |
| | | | | 13.6% | 2.3% | 1.1% | 16.7% | 4.3% |

表2: 血圧リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 48人 | 収縮期血圧 180mmHg以上または 拡張期血圧 110mmHg以上 | 24人 | 3人 | 21人 |
| 危険 343人 | 収縮期血圧 160mmHg以上または 拡張期血圧 100mmHg以上 | 140人 | 19人 | 184人 |
| 受診勧奨 1,543人 | 収縮期血圧 140mmHg以上または 拡張期血圧 90mmHg以上 | 500人 | 48人 | 995人 |
| 保健指導 2,120人 | 収縮期血圧 130mmHg以上または 拡張期血圧 85mmHg以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率62.0% |
| リスクなし 9,115人 | - | - | - | - |

表3: 血糖リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 115人 | 空腹時血糖 200mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 8.0%以上 | 93人 | 4人 | 18人 |
| 危険 290人 | 空腹時血糖 130mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 7.0%以上 | 193人 | 40人 | 57人 |
| 受診勧奨 211人 | 空腹時血糖 126mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 6.5%以上 | 104人 | 49人 | 58人 |
| 保健指導 4,590人 | 空腹時血糖 100mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 5.6%以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率21.6% |
| リスクなし 7,958人 | - | - | - | - |

表4: 脂質リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 11人 | 中性脂肪 1000mg/dl以上 | 3人 | 1人 | 7人 |
| 受診勧奨 624人 | 中性脂肪 300mg/dl以上または HDL 35mg/dl未満 | 167人 | 55人 | 402人 |
| 保健指導 2,403人 | 中性脂肪 150mg/dl以上または HDL 40mg/dl未満 | - | - | リスク保有者の 未受診率64.4% |
| リスクなし 10,126人 | - | - | - | - |

表2: 血圧リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 48人 | 収縮期血圧 180mmHg以上または 拡張期血圧 110mmHg以上 | 24人 | 3人 | 21人 |
| 危険 342人 | 収縮期血圧 160mmHg以上または 拡張期血圧 100mmHg以上 | 140人 | 19人 | 183人 |
| 受診勧奨 1,524人 | 収縮期血圧 140mmHg以上または 拡張期血圧 90mmHg以上 | 497人 | 48人 | 979人 |
| 保健指導 2,085人 | 収縮期血圧 130mmHg以上または 拡張期血圧 85mmHg以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率61.8% |
| リスクなし 8,790人 | - | - | - | - |

表3: 血糖リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 112人 | 空腹時血糖 200mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 8.0%以上 | 92人 | 3人 | 17人 |
| 危険 288人 | 空腹時血糖 130mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 7.0%以上 | 192人 | 39人 | 57人 |
| 受診勧奨 209人 | 空腹時血糖 126mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 6.5%以上 | 104人 | 47人 | 58人 |
| 保健指導 4,551人 | 空腹時血糖 100mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 5.6%以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率21.7% |
| リスクなし 7,624人 | - | - | - | - |

表4: 脂質リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 11人 | 中性脂肪 1000mg/dl以上 | 3人 | 1人 | 7人 |
| 受診勧奨 620人 | 中性脂肪 300mg/dl以上または HDL 35mg/dl未満 | 167人 | 55人 | 398人 |
| 保健指導 2,361人 | 中性脂肪 150mg/dl以上または HDL 40mg/dl未満 | - | - | リスク保有者の 未受診率64.2% |
| リスクなし 9,792人 | - | - | - | - |

表5: 血圧リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 18人 | 収縮期血圧 180mmHg以上または 拡張期血圧 110mmHg以上 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 危険 95人 | 収縮期血圧 160mmHg以上または 拡張期血圧 100mmHg以上 | 32人 | 1人 | 62人 |
| 受診勧奨 288人 | 収縮期血圧 140mmHg以上または 拡張期血圧 90mmHg以上 | 86人 | 16人 | 186人 |
| 保健指導 327人 | 収縮期血圧 130mmHg以上または 拡張期血圧 85mmHg以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率64.8% |
| リスクなし 2,512人 | - | - | - | - |

表6: 血糖リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 12人 | 空腹時血糖 200mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 8.0%以上 | 8人 | 0人 | 4人 |
| 危険 27人 | 空腹時血糖 130mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 7.0%以上 | 18人 | 5人 | 4人 |
| 受診勧奨 28人 | 空腹時血糖 126mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 6.5%以上 | 10人 | 8人 | 10人 |
| 保健指導 904人 | 空腹時血糖 100mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 5.6%以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率26.9% |
| リスクなし 2,269人 | - | - | - | - |

表7: 脂質リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 0人 | 中性脂肪 1000mg/dl以上 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 受診勧奨 34人 | 中性脂肪 300mg/dl以上または HDL 35mg/dl未満 | 6人 | 2人 | 26人 |
| 保健指導 211人 | 中性脂肪 150mg/dl以上または HDL 40mg/dl未満 | - | - | リスク保有者の 未受診率76.5% |
| リスクなし 2,995人 | - | - | - | - |

表5: 血圧リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 18人 | 収縮期血圧 180mmHg以上または 拡張期血圧 110mmHg以上 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 危険 94人 | 収縮期血圧 160mmHg以上または 拡張期血圧 100mmHg以上 | 32人 | 1人 | 61人 |
| 受診勧奨 281人 | 収縮期血圧 140mmHg以上または 拡張期血圧 90mmHg以上 | 86人 | 16人 | 179人 |
| 保健指導 317人 | 収縮期血圧 130mmHg以上または 拡張期血圧 85mmHg以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率64.1% |
| リスクなし 2,183人 | - | - | - | - |

表6: 血糖リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 12人 | 空腹時血糖 200mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 8.0%以上 | 8人 | 0人 | 4人 |
| 危険 27人 | 空腹時血糖 130mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 7.0%以上 | 18人 | 5人 | 4人 |
| 受診勧奨 27人 | 空腹時血糖 126mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 6.5%以上 | 10人 | 8人 | 9人 |
| 保健指導 877人 | 空腹時血糖 100mg/dl以上または HbA1c(NGSP値) 5.6%以上 | - | - | リスク保有者の 未受診率25.8% |
| リスクなし 1,950人 | - | - | - | - |

表7: 脂質リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 0人 | 中性脂肪 1000mg/dl以上 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 受診勧奨 33人 | 中性脂肪 300mg/dl以上または HDL 35mg/dl未満 | 6人 | 2人 | 25人 |
| 保健指導 206人 | 中性脂肪 150mg/dl以上または HDL 40mg/dl未満 | - | - | リスク保有者の 未受診率75.8% |
| リスクなし 2,654人 | - | - | - | - |

表8: 肥満度と医療費の関係




表8: 肥満度と医療費の関係



表9:腎機能リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 110人 | 尿蛋白(++)以上または GFR 50未満 | 67人 | 5人 | 38人 |
| 受診勧奨 32人 | 尿蛋白(+)かつ GFR 50以上 | 12人 | 5人 | 15人 |
| リスクなし 13,005人 | - | - | - | リスク保有者の 未受診率37.3% |

表9:腎機能リスク者の状況 **組合員**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 110人 | 尿蛋白(++)以上または GFR 50未満 | 67人 | 5人 | 38人 |
| 受診勧奨 31人 | 尿蛋白(+)かつ GFR 50以上 | 12人 | 5人 | 14人 |
| リスクなし 12,627人 | - | - | - | リスク保有者の 未受診率36.9% |

表10:腎機能リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 9人 | 尿蛋白(++)以上または GFR 50未満 | 3人 | 1人 | 5人 |
| 受診勧奨 8人 | 尿蛋白(+)かつ GFR 50以上 | 2人 | 1人 | 5人 |
| リスクなし 3,194人 | - | - | - | リスク保有者の 未受診率58.8% |

表10:腎機能リスク者の状況 **被扶養者**

| リスクレベル | | 医療機関受診状況 | | |
|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | 受診済・投薬あり | 受診済・投薬なし | 未受診 |
| 高危険 9人 | 尿蛋白(++)以上または GFR 50未満 | 3人 | 1人 | 5人 |
| 受診勧奨 8人 | 尿蛋白(+)かつ GFR 50以上 | 2人 | 1人 | 5人 |
| リスクなし 2,853人 | - | - | - | リスク保有者の 未受診率58.8% |